

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(*συμπληρώνεται προαιρετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Όνομα αναισθησιολόγου*:

Διεύθυνση/ Πόλη.....

Τηλέφωνο Email.....

Όνομα νοσοκομείου:

Τύπος νοσοκομείου:

α. Πανεπιστημιακό ή Πανεπιστημιακό/ΕΣΥ

β. ΕΣΥ

γ. Ιδιωτικό

ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ (ΚΤ)

1. **Συνολικός αριθμός ΚΤ** που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο σας (με κάθε είδος αναισθησίας) κατά τη διάρκεια του 6-μήνου της μελέτης:.....

2. Από αυτές σε πόσες εφαρμόστηκε:

α. **Ραχιαία αναισθησία**- σύνολο:.....

β. **Συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδιο** αναισθησία-σύνολο:.....

γ. **Επισκληρίδιος αναισθησία**-σύνολο:.....

i. Εξ αυτών ο επισκληρίδιος καθετήρας τοποθετήθηκε στο χειρουργείο-αριθμός:.....

ii. Είχε ήδη τοποθετηθεί στην αίθουσα τοκετών για αναλγησία τοκετού-αριθμός:.....

δ. **Γενική αναισθησία**-σύνολο:.....

Οι λόγοι για γενική αναισθησία ήταν:

i. Επείγον περιστατικό-δεν υπήρχε χρόνος για περιοχική αναισθησία-αριθμός:.....

ii. Επιθυμία επιτόκου –αριθμός:.....

iii. Παθολογία επιτόκου- αριθμός:.....

iv. Άλλοι λόγοι –αριθμός:.....

3. Σχετικά με την **αναλγησία μετά από ΚΤ** πόσες γυναίκες έλαβαν:

α. **Επισκληρίδιο αναλγησία** (διατήρηση επισκληρίδιου καθετήρα μετεγχειρητικά)-αριθμός:.....

β. **Υπαραχνοειδώς οποιοειδή** μακράς διάρκειας δράσης (πχ. μορφίνη)-αριθμός:

γ. **Συστηματικά οποιοειδή** IM, SC, IV (μορφίνη, πεθιδίνη, τραμαδόλη, προποξυφαίνη=romidon/zideron, κωδεΐνη)-αριθμός:.....

δ. **TAP block**-αριθμός:

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ (ΦΤ)

4. **Συνολικός αριθμός ΦΤ** που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο σας (με κάθε είδος αναλγησίας/ή χωρίς αναλγησία) κατά τη διάρκεια του 6-μήνου της μελέτης:

5. Από αυτούς, σε πόσους εφαρμόστηκε:

α. **Επισκληρίδιος** αναλγησία-αριθμός:.....

β. **Συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδιος** τεχνική-αριθμός:.....

γ. **Ραχιαία** τεχνική –αριθμός:.....

δ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται καθετήρας για μετεγχειρητική αναλγησία διατηρείται συνήθως για 24 h 48 h 72 h

6. Ποιες **άλλες μέθοδοι** χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο σας για αναλγησία σε ΦΤ (βάλτε “X” σε όσες επιλογές ισχύουν)

α. PCA με ρεμφεντανύλη: Συχνά , σπάνια , ποτέ

β. Πεθιδίνη IM: συχνά , σπάνια , ποτέ

γ. Απλά αναλγητικά (πχ παρακεταμόλη): συχνά , σπάνια , ποτέ

δ. Blocks που πραγματοποιούνται από τον μαιευτήρα (πχ αιδοϊκό):

συχνά , σπάνια , ποτέ

ε. Άλλες μέθοδοι: – Διευκρινίστε

στ. Καμιά αναλγησία: Συχνά , σπάνια , ποτέ

ζ. Δεν γνωρίζω, διότι οι αναισθησιολόγοι δεν εμπλέκονται καθόλου με την αίθουσα τοκετών

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ

7. Ποιες **βελόνες ραχιαίας** χρησιμοποιούνται συνήθως στο νοσοκομείο σας για τα μαιευτικά περιστατικά:

α. **Τύπος βελόνης:**

Quincke (κόπτουσα άκρη) Pencil point Και οι δύο τύποι

β. **Εύρος βελόνης** (μπορείτε να σημειώστε περισσότερες από 1 επιλογές):

22 G 25 G 27G 29G

8. Υπάρχουν σετ για επισκληρίδιο τεχνική στο Τμήμα σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

9. Υπάρχουν σετ για συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδιο στο Τμήμα σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

10. Υπάρχει διαθέσιμος υπέρηχος στο τμήμα σας ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, τον χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιήσετε TAP blocks, ή νευραξονικούς αποκλεισμούς σε μαιευτικά περιστατικά (πχ διευκόλυνση ραχιαίας/επισκληριδίου σε παχύσαρκες)

α. Συχνά

β. Σπάνια

γ. Ποτέ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Σχετικά με τις επιπλοκές (σχετιζόμενες με την αναισθησία/αναλγησία) που συνέβησαν στα μαιευτικά περιστατικά κατά τη διάρκεια του 6-μήνου της μελέτης:

11. Επισκληρίδιο **αιμάτωμα**: αριθμός:.....
12. Επισκληρίδιο **απόστημα**: αριθμός:.....
13. **Κεφαλαλγία λόγω τυχαίας τρώσης σκληράς** με βελόνα Tuohy: αριθμός:.....
 - α. Από αυτές, σε πόσες εφαρμόστηκε συντηρητική αγωγή (κατάκλιση, αναλγητικά)-αριθμός:.....
 - β. Σε πόσες εφαρμόστηκε blood patch-αριθμός:.....

ΜΕΡΟΣ ΙV –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

14. Σύνολο ειδικευμένων αναισθησιολόγων στο Τμήμα σας:.....
 - α. Πόσοι εξ' αυτών εμπλέκονται στα μαιευτικά περιστατικά-αριθμός:.....
 - β. Πόσοι εφαρμόζουν **ραχιαία αναισθησία** σε μαιευτικά περιστατικά-αριθμός:.....
 - γ. Πόσοι είναι εξοικειωμένοι με την **επισκληρίδια ή συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδια αναισθησία** σε μαιευτικά περιστατικά-αριθμός:.....
 - δ. Πόσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με περιοχικές τεχνικές στα μαιευτικά και χορηγούν μόνο/πάντα **γενική αναισθησία** στις ΚΤ- αριθμός:.....
15. **Λόγοι για τη ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ περιοχικής αναισθησίας/αναλγησίας στα μαιευτικά περιστατικά** (σημειώστε, όσες απαντήσεις θεωρείτε ότι αφορούν το νοσοκομείο σας για το συγκεκριμένο διάστημα που διεξάγεται η μελέτη)
 - α. Έλλειψη υλικού/εξοπλισμού
 - β. Έλλειψη δεξιοτήτων/γνώσης/εκπαίδευσης
 - γ. Μη επιθυμία των επιτόκων
 - δ. Προτιμήσεις των μαιευτήρων
 - ε. Προτιμήσεις των αναισθησιολόγων
 - στ. Άλλοι λόγοι